



Поради FECAVA щодо відповіального використання антимікробних препаратів

Чи повинен я використовувати антимікробні препарати у даного пацієнта?

Використовуйте цю таблицю, щоб:

- Прийняття рішення у виборі терапії;
- Уникайте недоцільного застосування антимікробних препаратів



Вказівки, коли не потрібне системне застосування антимікробних препаратів

Профілактичне застосування для здорових тварин

- Планова санація ротової порожнини
- Лікування тварин, які не були в контакті з великою кількістю особин
- Перед в'язкою / під час відлучення

Хірургія неінфікованих / незаражених тканин

- Планова кастрація та стерилізація
- Рутинна лапаротомія
- Кесарів розтин
- Видалення неінфікованих пухлин
- Чиста короткочасна ортопедична хірургія (<1,5 години)
- Нейрохірургія
- Реконструктивна хірургія, отопластика, пластична хірургія

Неускладнені випадки діагностованої або підозрюваної вірусної етіології

- Гострий синдром вольєрного кашлю
- Гостра шлунково-кишкова інфекція
- Вірусні інфекції верхніх дихальних шляхів
- FCV
- (FeLV) / (FIV)
- Риніт

Інші захворювання, неускладнені бактеріальною мікрофлорою

- Хвороби нижніх відділів сечовивідних шляхів кішок (FLUTD)
- Ювенільний вагініт
- Гострий кон'юнктивіт
- Хронічний бронхіт
- Запальні захворювання кишечнику (IBD)
- Гіперплазія передміхурової залози або кіста передміхурової залози
- Запалення параанальних залоз без абсцесування
- Рани з добре сформованою грануляційною тканиною

Стані, які можуть відповісти на лікування антисептиками чи іншими засобами для локального призначення

- Неускладнені шкірні пошкодження або мало інфіковані рани та укуси
- Поверхнева піодерма
- Себорейні шкірні захворювання
- Зовнішній отит
- Хвороби періодонту

Інші неускладнені стани бактеріальної етіології

- Абсцеси від укусів у кішок
- Гастроентерит, спричинений *Salmonella*
- Гастроентерит, спричинений *Campylobacter* spp
- Гастроентерит, спричинений *Clostridium difficile*