



**FECAVA**  
Federation of European Companion  
Animal Veterinary Associations



## ПОПЕРЕДЖЕННЯ ІНФЕКЦІЇ

Суворе дотримання заходів гігієни має важливе значення для запобігання передачі нозокоміальних інфекцій тваринам і людям як в умовах ветеринарних клінік, так і в суспільстві в цілому.

# Ключові рекомендації FECAVA щодо дотримання гігієни і інфекційного контролю у ветеринарній практиці

## ОЧИЩЕННЯ І ДЕЗІНФЕКЦІЯ РУК

Дотримання належної гігієни рук хірурга є ключем до контролю за розповсюдженням нозокоміальних інфекцій у ветеринарній практиці.

### МІТТЯ РУК

Використання води і мила з відповідним pH

- На початку і в кінці робочого дня.
- Після відвідування вірталіні.
- До і після вживання ікі, або куріння.
- При видимому забрудненні.
- Після контакту з виділеннями тварин.
- Перед проведеним аспептичним або інвазивними процедурами, із подальшою дезінфекцією рук.

### ДЕЗІНФЕКЦІЯ РУК

(Використовуйте дезінфікуючі засоби на основі спирту (сумісний з pHEN 1500)

- Руки повинні бути сухі і чисті.
  - До і після проведення маніпуляцій із кожним окремим пацієнтом.
  - До і після надягання рукавичок.
  - Перш, ніж торкатися до медичного обладнання, дверних ручок і клавіатури.
- Не надягати ніяких прикрас (перстнів, браслетів), наручних годинників, не використовувати лак для нігтів. Нігті повинні бути короткими і чистими.



## ОДЯГАТИ ЗАХИСНИЙ ОДЯГ

Одягайте спеціальну уніформу для медперсоналу і не контактуйте з тваринами в повсякденному одязі. Для забезпечення чистоти рук і передпліч використовуйте спеціальні щіточки для миття рук, надягайте лабораторні халати з короткими рукавами і рукавички протягом роботи з пацієнтами. Захисний одяг також необхідно носити за межами ветеринарної клініки і прилеглої території.

### ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСНИЙ ОДЯГ

Маски, шапочки для волосся, стерильні халати та рукавички слід використовувати для проведення хірургічних і інвазивних процедур.

- Пластикові фартухи, рукавички і маски необхідно використовувати при:
- маніпуляціях з пацієнтами, у яких діагностовано чи, які підоzerюються у носійстві збудника контагіозних інфекційних захворювань.
- роботі з потенційно контаміновані рідинами і виділеннями тварин.

Мінайте уніформу:

- Між оглядом кожного окремого пацієнта.
- При переміщенні між відділеннями терапії, інфекційного стаціонару та інтенсивної терапії.



## МИЮЧІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ РОЗЧИНІ

Використовуйте схвалені для ветеринарної медицини, миючі і дезінфікуючі засоби, дотримуючись інструкції, вказаної на етикетці. Використовуйте рукавички. При обробці медичного обладнання дотримуйтесь рекомендацій виробників.

### ПОВЕРХНІ І ОБЛАДНАННЯ

- Необхідно чистити і дезінфікувати до і після кожного пацієнта і при видимому забрудненні або контамінації мікроорганізмами.
- Також необхідно щодня або регулярно проводити дезінфекцію дверних ручок, клавіатури, вимикачів світла, телефонів, моніторів для проведення анестезії.

### МІСЦЯ, ЯКІ ВІДВІДУЮТЬСЯ НАЙЧАСТИШЕ (ВХІДНІ ДВЕРІ, КІМНАТА ПРИЙОМУ, ОЧІКУВАННЯ І КОРИДОРІ)

- Слід мити і дезінфікувати щодня, а також при видимому забрудненні або контамінації мікроорганізмами.



### ПРИЙМАЛЬНІ, СТАЦІОНАР I ВІДДІЛЕННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ

- Слід чистити і дезінфікувати до і після кожного пацієнта, а також при видимому забрудненні або контамінації мікроорганізмами. Необхідно регулярно перевіряти правила дезінфекції.

## ВИКОРИСТОВУЙТЕ РУКАВИЧКИ

При проведенні маніпуляцій тваринам, хворим на інфекційні захворювання (включаючи паразитарні інвазії), або тваринам-носіям.

При контакті з тваринами, у яких діагностовано чи, які підоzerюються у носійстві збудника резистентних інфекцій.

При обробці всіх ран і пошкоджень на шкірі.

При контакті з кров'ю, біологічними рідинами, виділеннями та слизовими оболонками.

Під час операції або при необхідності аспептики (подвійні рукавички). Використовуйте стерильні рукавички.

Мінайте рукавички між маніпуляціями з кожним окремим пацієнтом і при видимому забрудненні.

Мінайте рукавички при переході від аспептичних процедур до стерильних при роботі з одним і тим же пацієнтом.

Мінайте рукавички перед користуванням обладнанням, дверними ручками і клавіатурою.

Очищайте руки до і після зміни рукавичок. Носіння рукавичок не є заміною механічної гігієни рук!



## ХІРУРГІЧНА ПІДГОТОВКА

Виділені для хірургічного відділення форми, шапочки і маски повинен носити весь персонал.

Операційну слід використовувати тільки для проведення хірургічних процедур.

Стриги (не голити) ділянки тіла пацієнта, на яких плануються хірургічні втручання, необхідно безпосередньо перед операцією в окремому приміщенні. Слід чистити і дезінфікувати ножиці між кожним пацієнтом.

Підготовка шкіри після операції проводиться з використанням антибактеріального мила з водою, а потім спирту і хлоргексидину. Використовуйте рукавички.

1. Промийте ділянку оперативного втручання з допомогою господарського мила перед початком дезінфекції

2. Дезінфікуйте шкіру, використовуючи противібробне мило з водою. Процедура повинна тривати не менше 3 хвилин.

3. Промийте або обробіть шкіру спиртом або спиртовмісними розчинами.

• Використовуйте стерильні інструменти. Стерилізацію слід проводити в автоклаві, якщо це можливо. Холодна стерилізація допускається тільки за виняткових обставин.

• Не допускайте, щоб тварина вилизувала, дряпала, або іншим чином травмувала ділянку хірургічного втручання.

• Обробляйте рані і пов'язки, дотримуючись техніки аспептики і антисептика.



## ПРАННЯ ОДЯGU ТА БІЛІЗНИ

Уніформи та лабораторні халати - щодня і при видимому забрудненні або можливій контамінації.

Лежаки і підстилки для тварин - окремо, після кожного пацієнта, при забрудненні, або бактеріальної контамінації.

Пральні повинні бути розміщені в окремому приміщенні, або надатися професійною компанією.

Перед пранням очистіть видимі забруднення (використовуйте рукавички).

Періть при температурі води 60 °C. Висушувати слід при високій температурі для знищення інфекційних агентів.

Підтримуйте чіткий розподіл приміщень у пральні для зберігання брудної і чистої білизни, щоб уникнути перехресної контамінації.

Зберігайте чисту білизну в спеціально відведеніх місцях.



## НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ

Навчайте і інформуйте всіх співробітників клініки про необхідність дотримання належної гігієни у щоденній практиці, оскільки не полегшить правильне проведення гігієнічних заходів.

• Необхідно розробити письмові протоколи дотримання гігієни, які повинні бути на видному місці, і призначити співробітника, відповідального за пропаганду і дотримання даних правил.

• Проводити ретельну підготовку персоналу і заохочувати їх участь у курсах підвищення кваліфікації з питань гігієни.

• Проводьте належні заходи з прибирання та дезінфекції у власному будинку, щоб при переміщенні в клініку, була всюди дотримана чистота.



## ІНФОРМУВАННЯ ВЛАСНИКІВ ТВАРИН

Використовуйте друковану документацію (листівки, плакати) для комунікації з власниками.

• Забезпечуйте належну гігієну протягом ведення клінічного прийому, інформуйте про важливість гігієни при контакті власників з їхніми тваринами в будинку і на вулиці.

• Докладайте зусилля з боку ветеринарного персоналу щодо поліпшення гігієни і відповідального використання антимікробних препаратів, а також суворого дотримання призначеної терапії.

• Дані заходи важливо проводити, щоб краще розуміти загрозу і контролювати наслідки для здоров'я суспільства від зоонозних і резистентних до інфекційних агентів захворювань у домашніх тварин.

