

DA LI STE ZNALI?

Psi takođe mogu dobiti toplotni udar (opekotine na šapama) pri svakodnevnim aktivnostima kao što su trčanje, šetanje, ili igra.

svakodnevnim aktivnostima

kao što su trčanje, šetanje, ili igra.

Oštećenje mozga

počinje već kod tjelesne temperature od

41°C.

Stopa **smrtnosti** je oko **50%**.



Što je duže **vremensko razdoblje,**


s visokom tjelesnom temperaturom to je veća mogućnost da se završi s letalnim ishodom.

PSI SA POVEĆANIM RIZIKOM

Brahicefalični
Radni, takmičarski psi
Gojazni

Tamne dlake

Na **32+ °C,** toplotni udar je značajan rizik nepovezan sa fizičkom spremnošću, veličinom, bojom ili rasom psa



TOPLOTNI UDAR KOD PASA

SIMPTOMI

Nemir

Teško disanje

Crvene ili blijede desni

Povraćanje

Letargija

Nedostatak apetita i koordinacije pokreta

Kolaps/šok/koma



DEFINICIJA


TOPLOTNI UDAR SE DEŠAVA, KADA NORMALNI TJELESNI MEHANIZMI NE MOGU ODRŽATI TEMPERATURU TIJELA U NORMALNOM RASPONU.

PSI NEMAJU EFIKASAN SISTEM HLAĐENJA TIJELA KAO LJUDI (KOJI SE ZNOJE) I TIJELO IM SE LAKO PREGRIJE.

TOPLOTNI UDAR SE MOŽE SPRIJEČITI!

KAKO PREVENIRATI TOPLOTNI UDAR:

- ! **Smanjiti** vježbanje.
- ! Uvijek obezbijediti **vodu za piće** i **mjesto u hladovini.**
- ! Šetajte sa psom **samo ujutro** ili **kasnije uveče.**
- ! **Nikada ne ostavljajte** psa u **autu** ili **pregrijanoj prostoriji.**
- ! Budite svjesni **zdravstvenog stanja** vašeg psa.



ŠTA PREDUZETI AKO POSUMNJATE NA TOPLOTNI UDAR KOD VAŠEG PSA

1. Smjestite psa u **hladovinu** na **hladnu površinu.**
2. Ponudite mu **hladnu vodu.**
3. Na **glavu, vrat** i **grudi** stavite **mokre** – **hladne peškire.**
4. **Odmah odvedite** psa **veterinaru.**

