

DA LI STE ZNALI?

Psi mogu dobiti toplotni udar (i opekotine na šapama) u toku

svakodnevnih aktivnosti

kao što su trčanje, šetanje ili igranje.

Oštećenje mozga

može nastati pri telesnoj temperaturi od

41°C.

Stopa **mortaliteta** je oko **50%**.



Što pas duže ima **visoku telesnu temperaturu**, to je veća šansa da će doći do njegovog uginuća.

PSI SA POVEĆANIM RIZIKOM

Brahicefalični psi


Radni, takmičarski psi

Gojazni

Psi sa tamnim krznom

Na **32+ °C**, povećan je rizik od toplotnog udara bez obzira na fizičku spremnost, veličinu, boju psa ili rasu!

Psi u slaboj fizičkoj kondiciji koji vežbaju u toplim/vlažnim uslovima



SIMPTOMI

Uznemirenost
Izraženo dahtanje

Zacrvenjene ili blede sluzokože

Povraćanje

Letargija

Nedostatak apetita ili koordinacije

Kolaps/šok/koma

TOPLOTNI UDAR KOD PASA



DEFINICIJA

TOPLOTNI UDAR NASTAJE KADA TERMOREGULACIONI MEHANIZMI NE MOGU DA ODRŽE TELESNU TEMPERATURU U FIZIOLOŠKIM GRANICAMA.

PSI NEMAJU EFIKASAN SISTEM RASHLAĐIVANJA TELA KAO LJUDI KOJI TO POSTIŽU ZNOJENJEM, TE SE LAKO MOGU PREGREJATI.

TOPLOTNI UDAR JE STANJE KOJE SE MOŽE SPREČITI!

KAKO SPREČITI TOPLOTNI UDAR:

- ⚠ **Ograničiti** vežbanje psa
- ⚠ Obezbediti psu da uvek ima **svežu vodu** za piće i **senovito mesto** boravka
- ⚠ Psa šetati samo **rano ujutru** ili **kasnije u toku večeri**
- ⚠ Nikada ne **ostavljati** psa ili mačku u **pretoploj prostoriji**
- ⚠ Imajte na umu **zdravstveno stanje** vašeg psa



KORACI KOJE TREBA PREDUZETI UKOLIKO BRINETE DA VAŠ PAS IMA TOPLOTNI UDAR

1. Nađite **hladovinu** u koju ćete skloniti psa sa vrućine i smestite ga na **hladnu površinu**
2. Ponudite mu **male količine hladne vode**
3. Stavite mu **hladne peškire** na **glavu, vrat i grudi**
4. Odmah odvedite svog psa **veterinaru!**