

ВИ ЗНАЛИ, ЩО...

Собаки також можуть отримати тепловий удар (опіки лап) від

ПОВСЯКДЕННИХ ДІЙ,

таких як біг, прогулянка або гра.

Brain damage

can occur at core temperatures as low as

41°C.

Рівень смертності становить близько **50%**.



Чим довше собаки відчують

дуже високу температуру тіла,

тим більша ймовірність їх смерті.


СОБАКИ З ПІДВИЩЕНИМ РИЗИКОМ

брахіцефали

Робочі, змагальні собаки

З ожирінням

З темним забарвленням шерсті



При **32+ °C,**

тепловий удар є значним ризиком незалежно від фізичної підготовки, розміру, кольору чи породи!

Фізично нездорові собаки, які тренуються в жарких/вологих умовах

СИМПТОМИ

Неспокійність

Важке дихання

Червоні або бліді ясна

блювання

Млявість

Відсутність апетиту або координації

Колапс/шок/кома

ТЕПЛОВИЙ УДАР У СОБАК



ВИЗНАЧЕННЯ

ТЕПЛОВИЙ УДАР ВИНΙΚАЄ, КОЛИ НОРМАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ОРГАНІЗМУ НЕ МОЖУТЬ ПІДТРИМУВАТИ ТЕМПЕРАТУРУ ТІЛА В БЕЗПЕЧНОМУ ДІАПАЗОНІ.

СОБАКИ НЕ МАЮТЬ ЕФЕКТИВНИХ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ, ЯК ЛЮДИ (ЯКІ ПОТІЮТЬ) І МОЖУТЬ ЛЕГКО ПЕРЕГРІТИСЯ.



ТЕПЛОВОМУ УДАРУ МОЖНА ЗАПОБІГТИ!

ЯК ЗАПОБІГТИ ТЕПЛОВОМУ УДАРУ:

- Обмежити** фізичні навантаження
- Завжди забезпечуйте **питну воду** та **затінене місце**
- Вигулуйте собаку тільки **вранці або пізно ввечері**
- Ніколи не **залишайте** собаку в **машині** чи **жаркому приміщенні**
- Будьте в курсі проблем зі **здоров'ям** **вашої собаки**

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ БОЇТЕСЯ, ЩО ВАША СОБАКА ОТРИМАЛА ТЕПЛОВИЙ УДАР:

- 1.** Знайдіть тінь, перенесіть собаку з тепла на холодну поверхню
- 2.** Запропонуйте невеликими порціями прохолодної води
- 3.** Прикладіть прохолодні рушники до голови, шиї та грудної клітини
- 4.** Негайно везіть собаку до ветеринара!