

10 PRINCIPALES PATHOLOGIES BUCCO-DENTAIRES CHEZ LES CHATS ET LES CHIENS



Points clés

1. Les maladies dentaires, buccales et maxillo-faciales sont les problèmes cliniques **les plus courants** dans les établissements vétérinaires pour petits animaux.
2. Un examen buccal complet doit être réalisé chez **tous les animaux et à chaque visite.**
3. Les maladies buccodentaires sont largement **sous-diagnostiquées et sous-traitées** dans le monde.

Pathologies buccales canines les plus courantes

1. Maladies parodontales
2. Dents de lait persistantes
3. Fracture dentaire
4. Malocclusion
5. Masses dans la cavité orale



Pathologies félines les plus courantes

1. Maladies parodontales
2. Gingivite juvénile
3. Résorption dentaire
4. Stomatite caudale
5. Traumatisme buccal



 <p>Maladies parodontales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Causées par la plaque dentaire, c'est-à-dire les bactéries qui recouvrent la surface de la dent. • Affectent la plupart des chiens et des chats de tout âge, taille ou race. <p>Mesures à prendre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultation dentaire • Évaluation clinique et radiographie sous anesthésie générale <p>Traitement possible</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chirurgie parodontale • Extractions dentaires • Mise en place d'une hygiène bucco-dentaire et suivi 	 <p>Fracture dentaire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Présente chez 49,6 % des animaux de compagnie. • Cause habituellement de la douleur et une infection. <p>Mesures à prendre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultation dentaire • Évaluation clinique et radiographie sous anesthésie générale <p>Traitement possible</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traitement endodontique • Traitement conservateur (reconstitution, restauration) • Extractions dentaires • Mise en place d'une hygiène bucco-dentaire et suivi 	 <p>Résorption dentaire</p> <ul style="list-style-type: none"> • La perte de tissu dentaire dur est courante chez les chats et les chiens domestiques. • Des études ont montré que de 20 % à 75 % des chats âgés sont cliniquement touchés. <p>Mesures à prendre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultation dentaire • Évaluation clinique et radiographie sous anesthésie générale <p>Traitement possible</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extractions dentaires • Mise en place d'une hygiène bucco-dentaire et suivi
 <p>Traumatisme buccal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les animaux peuvent avoir un gonflement et une déformation de la face, des saignements, de la salivation ou une malocclusion. • Certains patients présentent peu ou pas de signes cliniques. <p>Mesures à prendre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultation chirurgicale • Évaluation clinique et radiographique (préférentiellement en 3D) sous anesthésie générale <p>Traitement possible</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réduction de la fracture orale • Gestion des lésions des tissus mous • Mise en place d'une hygiène bucco-dentaire et suivi 	 <p>Masses orales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les tumeurs buccales représentent environ 7 % des tumeurs chez les chiens et environ 10 % chez les chats. • Plus le diagnostic est précoce, plus le traitement sera efficace. <p>Mesures à prendre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultation chirurgicale/oncologique • Évaluation clinique et radiographie sous anesthésie générale • Biopsie <p>Traitement possible</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervention chirurgicale oncologique : excision de la masse • Thérapie complémentaire • Mise en place d'une hygiène bucco-dentaire et suivi 	 <p>Malocclusion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tout défaut d'alignement qui n'est pas normal pour la race. • Peut être purement esthétique ou résulter d'un traumatisme. <p>Mesures à prendre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultation orthodontique • Évaluation clinique et radiographie sous anesthésie générale <p>Traitement possible</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orthodontie interceptive • Traitement préventif • Traitement correctif • Mise en place d'une hygiène bucco-dentaire et suivi
 <p>Dents de lait persistantes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dents de lait qui ne tombent pas, plus fréquent chez les races de chiens de petite taille. • Peut causer des problèmes orthodontiques et parodontaux. <p>Mesures à prendre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultation dentaire • Évaluation clinique et radiographie sous anesthésie générale <p>Traitement possible</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extraction interceptive • Mise en place d'une hygiène bucco-dentaire et suivi 	 <p>Gingivite juvénile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peut être associée à des problèmes d'éruption dentaire chez les chiens et les chats. • De plus en plus de chatons sont touchés et nécessitent un diagnostic et une prise en charge précoces. <p>Mesures à prendre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultation dentaire • Évaluation clinique et radiographie sous anesthésie générale <p>Traitement possible</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gingivoplastie et gingivectomie • Mise en place d'une hygiène bucco-dentaire et suivi 	 <p>Stomatite caudale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réaction inflammatoire sévère des tissus oraux des chats. • Inconfort accru, douleur et effets sur l'organisme. <p>Mesures à prendre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultation dentaire • Évaluation clinique et radiographie sous anesthésie générale <p>Traitement possible</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extractions sélectives ou totale • Traitement médical • Mise en place d'une hygiène bucco-dentaire et suivi



Jerzy Gawor,
MRCVS, DVM, PhD,
Dipl. AVDC, Dipl. EVDC



Brook A. Niemiec,
DVM, Dipl. AVDC,
Dipl. EVDC



= Statistiquement plus fréquent chez cette espèce.

